

**SVOBODNÝ A INFORMOVANÝ SOUHLAS S PLÁNOVANÝM VÝKONEM
ODBĚR VZORKŮ ZE ZEVNÍHO GENITÁLU****A****SNESENÍ KONDYLOMAT (GENITÁLNÍCH BRADAVIC) Z VULVY NEBO POCHVY**

Jméno, příjmení:

Datum narození/rodné číslo:

Bydliště: Kód ZP:

Důvod realizace tohoto zdravotního výkonu: Léčebný

Vážená paní,

Váš ošetřující lékař Vám na základě Vašeho zdravotního stavu doporučil:

1. ODBĚR VZORKŮ ZE ZEVNÍHO GENITÁLU**2. SNESENÍ KONDYLOMAT (GENITÁLNÍCH BRADAVIC) Z VULVY NEBO POCHVY****3. Jiné**

Máte právo svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb Vaší osobě, pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. K provedení navrhovaného vyšetření je potřeba Vašeho souhlasu.

Druh a povaha výkonu:

Jde o chirurgický zákrok, při kterém lékař odstraní z oblasti rodidel a jejich okolí kondylomata. To jsou bradavičnaté výrůstky způsobené virovou infekcí (lidský Papilomavirus – HPV). Přenáší se pohlavním stykem, po ošetření může dojít k recidivě (opakování) onemocnění.

Účel a předpokládaný prospěch výkonu:

Jedná se o drobný chirurgický zákrok prováděný v celkové anestezii nebo po domluvě s přijímajícím lékařem v lokálním znecitlivění. Podstatou operace je odběr vzorků nebo odstranění kondylomat (genitálních bradavic), znamének, polypů nebo drobných tukových cyst – ateromů z oblasti rodidel. Odstraněním těchto výrůstků se snižuje, ale zcela nepotlačuje riziko šíření infekce a zmírňují se obtíže, které mohou kondylomata způsobovat.

Průběh výkonu:

Zákrok se provádí v krátkodobé celkové anestezii nebo po domluvě s přijímajícím lékařem je možné provést výkon i v lokální anestezii v tzv. znecitlivění. Po dezinfekci postižené oblasti se odstranění genitálních bradavic provádí zpravidla snesením ostrého nástroje po ošetření kryosprejem. Vetší nálezy je nutno ošetřit excizí, tj. vyříznutím skalpelem a následnou suturou – zašitím vstřebatelným stehem. Získaný materiál se zpravidla zasílá k histopatologickému vyšetření.

Možná rizika, komplikace a následky výkonu:

Zákrok díky moderním postupům přináší obecně nízké riziko závažných komplikací. I přes veškerá opatření, ale může dojít k jejich vzniku. Všem komplikacím nejde ani přes pečlivou operační techniku zabránit (různé anatomické dispozice a změny předchozími a současnými nemocemi, rozdíly ve zdraví atd.). Komplikace mohou vést ke změně rozsahu a výsledku výkonu, úpravě pooperačního režimu (včetně možnosti reoperace) a trvalým následkům, v krajním případě zcela raritně ke smrti. Komplikace se mohou projevit jak během zákroku, tak v pooperačním období. Tento text nemůže zcela obsáhnout všechny možné komplikace a jejich důsledky (srovnejte s rozsahem odborných publikací v oboru gynekologie, chirurgie, vnitřního lékařství, anesteziologie a resuscitační medicíny) – jsou uvedeny ty nejčastější.

Mezi možné komplikace patří krvácení během operace nebo po operaci, tvorba krevních sraženin v operačním poli (hematom), tvorba krevních sraženin v žilách (trombóza), uzavření cév krevní sraženinou (embolie), tvorba nových kondylomat, tvorba nadměrné nevzhledné a bolestivé jizvy (keloid), reakce na šicí materiál (granlom) nebo infekce v operačním poli s možným rozpadem operační rány. Může také dojít k neúmyslnému poškození okolních orgánů, jako je močový měchýř nebo střevo – zejm. při rozsáhlém poškození poševních stěn. Vzácně se mohou objevit píštěle, například mezi močovým měchýřem a pochvou, které by vyžadovaly další operaci. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám vysvětleny před operací lékařem anesteziologem.

Alternativy výkonu:

K tomuto výkonu není alternativa. V případě, že se rozhodnete tento zákrok nepodstoupit, je možné zvolit léčbu pomocí aplikace speciálních krémů, které mohou pomoci v boji proti kondylomům. Je však třeba mít na paměti, že tato metoda nemusí být tak účinná a riziko recidivy (návratu) onemocnění zůstává.

Omezení v obvyklém způsobu života a pracovní schopnosti:

Omezení závisí na rozsahu ošetření. Míra nepohodlí lze přirovnat k poranění při holení genitálu. Po dobu hojení je potřeba zvýšený hygienický režim a je nutné vynechat pohlavní styk. Pracovní neschopnost závisí na rozsahu ošetření a Vaší práci – obvykle několik dní, nemusí být potřeba vůbec. Po celkové anestezii není možné 24 hodin řídit vozidlo, obsluhovat stroje, pracovat ve výškách.

Následný léčebný režim, preventivní opatření a kontrolní zdravotní výkony:

Po dobu hojení je potřeba péče o rány – udržovat v suchu a čistotě, po každém použití toalety omýt roditla vodou bez dráždivých mycích prostředků a osušit, výběrově je dle doporučení lékaře vhodná i lokální aplikace dezinfekčních přípravků/přípravků k urychlení hojení, dále nechodit do bazénu/vany, pokud možno nenosit spodní prádlo event. nosit bavlněné spodní prádlo s prodyšnou vložkou. Při potížích po zákroku je potřeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Jde o onemocnění přenosné pohlavním stykem, po dobu hojení je nutné vynechat pohlavní styk. Je vhodné zvážit vakcinaci proti lidským Papillomavirům (HPV). Tyto viry jsou pohlavně přenosné – některé způsobují genitální bradavice (kondylomata), jiné způsobují přednádorové změny a nádory genitálu, řitního otvoru a sliznic úst. Tyto problémy se často mohou vyskytovat společně, mohou se opakovat, a to i po menopauze. Proto je nezbytné chodit na pravidelné preventivní prohlídky celý život, i kdyby v budoucnu byla odstraněna děloha s čípkem. HPV může postihnout i jiné části genitálu než děložní čípek, což zdůrazňuje význam těchto prohlídek.

Narůstají důkazy, že očkování proti HPV virům snižuje riziko opakování kondylomat a vzniku rakoviny děložního čípku i při naočkování v době výskytu změn. I když je účinnost očkování nižší než u žen, které byly naočkovány před nástupem pohlavního života, je stále vyšší než u žen, které nebyly naočkovány vůbec.

Kouření také zhoršuje tyto změny, a proto Vám důrazně doporučujeme přestat kouřit, pokud kouříte. Kontrolní vyšetření naplánuje Váš ošetřující lékař při propuštění z hospitalizace.

Prohlášení lékaře:

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta srozumitelným způsobem informoval o plánovaném výkonu včetně upozornění na možná rizika, komplikace a veškeré výše uvedené informace byly poskytnuty pacientovi s mým nejlepším vědomím a svědomím.

Ve Zlíně dne: **Jmenovka a podpis lékaře:**

Souhlas pacienta:

Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že jsem byl/a lékařem v klidu a dostatečném časovém prostoru, srozumitelně informován/a o svém zdravotním stavu, navrhovaném výkonu a jeho prospěchu, včetně upozornění na možná rizika a komplikace. Byl/a jsem informován/a o léčebném režimu po výkonu a vhodných preventivních opatřeních. Byla mi sdělena a vysvětlena alternativní možnost léčby. Byly mi poskytnuty informace pro případ změny zdravotního stavu a údaje o možných změnách zdravotní způsobilosti. Byl/a jsem poučen/a o svém právu svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb, pokud toto mé právo není omezeno zákonem stanoveným důvodem. Informacím jsem plně porozuměl/a. Byla mi dána možnost klást doplňující dotazy, které mi byly řádně a dostatečně zodpovězeny.

Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení svobodně a výslovně souhlasím s výše uvedeným výkonem.

Prohlašuji, že moje čeština je na takové úrovni, že jsem vše pochopil/a.

Ve Zlíně dne: **Podpis pacienta (zákonného zástupce):**

Identifikace zákonného zástupce:

Jméno a příjmení:

Datum narození: Vztah k pacientovi: